

ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA



In caso di bambino diabetico:

La capacità di riconoscere i
primi segni dell'ipoglicemia
e della chetoacidosi
diabetica è essenziale



ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA



Paziente colpito da crisi ipoglicemica *lieve*:

In presenza di sintomi come fame eccessiva, cefalea, sudorazione eccessiva, tremori alle gambe, sonnolenza, difficoltà di concentrazione,... l'insegnante presente somministrerà le zollette di zucchero; se dopo 5 minuti non si ha miglioramento:

ATTIVARE IL 118

ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA



Paziente diabetico colpito da crisi ipoglicemica medio - grave:

- informare subito l'operatore del 118 che il bambino è diabetico
- descrivere i segni presenti (**turbe del comportamento, disturbi della parola, incoordinazione motoria, perdita di coscienza, convulsioni**)
- mettere in atto le istruzioni dell'operatore **in attesa dell' arrivo del mezzo di soccorso**



ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

ISTRUZIONI PRE - ARRIVO

Perdita di coscienza



- **Controllare la presenza di respiro**
- **Posizionare il paziente sul fianco con cautela**
- **Non mettere cuscini sotto la testa**
- **Non somministrare nulla per bocca (rischio di vomito e inalazione)**
- **se si ha ripresa della coscienza, somministrare zollette di zucchero o acqua molto zuccherata (utile sia che il paziente sia diabetico che no)**



ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

In presenza di un bambino con i seguenti sintomi, allertare sempre **il 118** (sia che si tratti di un bambino diabetico o no):

- **sete intensa, cute secca e calda, bocca arida, nausea e vomito, dolori addominali, urina eccessiva, respiro affannoso, alito che odora di acetone, stanchezza, sonnolenza**

CHETOACIDOSI DIABETICA